





Фізичні реакції (всі вікові категорії)

Враховуйте, будь ласка, що симптоми, наведені нижче, можуть бути проявами інших захворювань, тому передусім варто отримати консультацію лікаря-фахівця.

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| – Втома | – Слабкість | – Біль у тілі |
| – Розлади шлунково-кишкового тракту | – Запаморечення | – Сухість у роті |
| | – Тремтіння | – Головний біль |
| | – Біль у грудях | – Задуха |



Вік	Реакції
0-3 років 	<ul style="list-style-type: none"> – Збільшення потреби перебувати на руках у дорослого – Регрес у поведінці (повернення до поведінки притаманної дитині більш раннього етапу розвитку) – Зміни у режимі дня (сон, харчування) – Підвищена дратівливість
4-6 років 	<ul style="list-style-type: none"> – Потреба перебувати на руках у дорослого – Регрес у поведінці (повернення до поведінки притаманної дитині більш раннього етапу розвитку) – Зміни у режимі дня (сон, харчування) – Підвищена дратівливість – Зниження уваги
7-12 років 	<ul style="list-style-type: none"> – Усамітнення – Часті занепокоєння – Зміни у режимі дня (сон, харчування) – Підвищена дратівливість – Часті прояви агресії – Підвищений рівень тривожності
13-17 років (підлітки) 	<ul style="list-style-type: none"> – Відчуття сильного горя – Надмірна турбота про інших – Почуття провини та сорому – Недовіра владі